

Uwaga! Ptasia grypa

Data publikacji: 18.11.2022 16:00

Ptasia grypa coraz bardziej rozprzestrzenia się po Europie i jest szansa, że zawita nawet w powiecie cieszyńskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie apeluje o właściwe zabezpieczenie przydomowych hodowli drobiu.



fot: ilustracyjne/pixabay.com

Z powodu dużej liczby ognisk ptasiej grypy w Europie, istnieje ryzyko przeniesienia jej na teren powiatu cieszyńskiego. Zgodnie z wytycznymi Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie, przypominamy, jak zabezpieczyć hodowlę przed wirusem.

- Nie należy poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- Nie należy przywozić na teren hodowli zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
- Należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- Należy trzymać drób, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
- Należy przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu w sposób zabezpieczający je przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- Należy karmić i poić drób w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu, aby zabezpieczyć paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodów
- Należy przygotowywać gniazda dla drobiu wewnątrz budynków,
- Osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
- Należy dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającą informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.